

TUSSENKOMST DEXA-BOTMETING (>01.08.2010)

Betreft patiënt:

Criteria tussenkomst (1 keer per 5 jaar)

(duidt aan wat van toepassing is)

Groep 1	vrouwen > 65jr met geschiedenis van osteoporose , namelijk heupfractuur bij familie van 1 ^{ste} of 2 ^{de} graad	
Groep 2	ongeacht leeftijd of geslacht, indien één of meer van volgende risicofactoren aanwezig zijn	
	- niet oncologische low impact fractuur	
	- antecedenten van low impact fractuur (excl vingers, tenen, schedel, gelaat, CWZ)	
	- corticotherapie >3maand à equivalent >7,5mg prednisolone/dag	
	- oncologische patiënt(e) onder anti-hormonale therapie of in menopauze tgv oncologische therapie	
	- minstens één van volgende risicofactoren	
	- reumatoïde arthritis	
	- evolutieve niet behandelde hyperthyreoïdie	
	- hyperprolactinemie	
	- langdurig hypogonadisme (ook post therapie)	
	- renale hypercalciurie	
	- primaire hyperparathyreoïdie	
	- osteogenesis imperfecta	
	- ziekte/Syndroom van Cushing	
	- anorexia Nervosa BMI <19kg/m ²	
	- vroegtijdige menopauze (<45jr)	

Klinische risicovariabelen

(vul in en duidt aan)

Exacte leeftijd		
Gewicht		
Lengte		
Geslacht	Man	Vrouw
Vroegere fracturen?	Ja	Neen
Heupfractuur bij verwanten tot 2de graad?	Ja	Neen
Roken?	Ja	Neen
Gebruik corticoïden?	Ja	Neen
Rheumatoïde arthritis?	Ja	Neen
Secundaire osteoporose?	Ja	Neen
Gebruik van >3 eenheden alcohol per dag?	Ja	Neen

Arts die gegevens verstrekt
(stempel + handtekening + datum hieronder toevoegen)